



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA**

**TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

RESUMEN:

**FACTORES DE RIESGO CORRELACIONADOS CON LA
HEPATITIS B EN ADOLESCENTES TEMPRANOS DEL ÁREA DE
COBERTURA DEL SUBCENTRO DE SALUD BUENAVISTA DE
JULIO A OCTUBRE DEL 2012.**

AUTORA:

VERÓNICA CECIBEL MENDIETA LAVANDA

DIRECTORA DE TESIS:

LCDA. ANGELITA GRANDA FLORES

MACHALA – EL ORO – ECUADOR

2014

RESUMEN

En el subcentro de salud Buenavista acuden entre 70 y 90 adolescentes a la consulta médica para pedir consejería sobre las relaciones sexuales y modos de prevención, aproximadamente el 12% de la población adolescentes mientras que el resto lleva estilos de vida inadecuados en sus prácticas sexuales como la promiscuidad, el no uso del preservativo el desconocimiento, no estar vacunados por no haberse dejado administrar la vacuna durante el último año de escuela, por otra parte también se observa que los adolescentes se realizan tatuajes en centros donde no mantienen normas de asepsia. por lo cual he planteado la siguiente investigación que tuvo como objetivo general: Analizar los factores de riesgo correlacionados con la hepatitis B en adolescentes tempranos que pertenecen al área de cobertura del sub centro Buenavista de Julio a Octubre del 2012, utilizando un tipo de estudio descriptivo de corte transversal mediante la aplicación de una encuesta para obtener los datos además se aplico un test de conocimiento para saber cuánto conocen sobre la prevención de HB los adolescentes y se realizo un programa educativo. Entre los resultados están: La población de estudio son el 46.3% de 10 a 11 años de edad, el 40.8% son de 12 a 13 años, el 12.9% son adolescentes de 14 años. El 51,7% de sexo femenino, el 48,3% son de sexo masculino provienen el 95% de zona rural, el 5% en zona urbana. Pertenece el 100% a etnia mestiza, pertenece el 55,8% a familia nuclear, el 37,5% ampliada y el 6,7% nuclear incompleta.El 64,4% expuestos a riesgos bajos en la categoría besos profundos, el 63, 75% sin riesgos medios pero el 23,75 han tenido relaciones interfemorales, según el riesgo alto el 69, 2 no se han expuesto a este riesgo. El 27,1% han tenido relaciones sexuales vaginales con preservativo.El 97,9% no se auto informan sobre la prevención de hepatitis B, el 2,1% si lo hacen. 98,8% no buscan información sobre la prevención de hepatitis B, mientras que el 1,8% si lo hacen, el 64,2% se abstienen sexualmente, el 15% usan condón, el 9,2% mantienen relaciones sexuales con una pareja.