

RESUMEN

El cáncer de cérvix uterino actualmente se está desarrollando en la mayoría de las mujeres, en especial desde la etapa de la adolescencia hasta la madurez media, ante esta problemática se debe buscar formas que impidan el desarrollo progresivo de la enfermedad, incentivando a mantener un sano estilo de vida sexual, para mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas con alteraciones histológicas cervicas. Por lo cual se realizó la siguiente investigación que tuvo como objetivo general: Conocer los factores de riesgo en la neoplasia intracelular Grado I (NIC I) en las mujeres atendidas en Centro de Salud “El Paraíso”. Para despegar las siguientes variables a estudio como son: caracteres individuales, factores ginecológicos, estilos de vida, se utilizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal en 55 mujeres atendidas en el subcentro de salud con diagnóstico de NIC I, se desarrolló la investigación mediante tres fases la primera; que es del levantamiento de la información mediante el llenado de una guía de revisión de historias clínicas, la segunda fase; la de planificación y ejecución de un programa educativo sobre la prevención de la presentación de NIC I, una vez obtenidos los resultados en estas dos etapas se evaluó el plan educativo mediante el proceso, producto e impacto.

En el estudio dio como resultado q las edades relacionada con el control citológico que se realizan periódicamente las mujeres en edad fértil, así tenemos que el 49% de mujeres si se realizan el control de estas el 13% corresponden a la edad de 30-34 años y el 5% de 40-44 años de edad, mientras que el 51% de mujeres no se realizan el control citológico de estas el 22% son adolescentes y el 4% mujeres de 40 a 44 años de edad, denotando así la irresponsabilidad del grupo de las mujeres adolescentes que no cumplen con el control ginecológico aumentando así el riesgo de infectarse con NIC