



**UNIVERSIDAD DE MACHALA**  
**“Calidad, Pertinencia y Calidez”**  
**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA**  
**SALUD**  
**CARRERA DE ENFERMERÍA**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN**  
**DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**TEMA**

**PREVALENCIA Y COMPLICACIONES DE LOS**  
**ACCIDENTES OFÍDICOS EN LOS PACIENTES DE 15 – 60**  
**AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN**  
**VICENTE DE PAÚL. PASAJE. 2012-2014.**

**AUTORA**

**JOHANNA MARIA FAREZ PINEDA**

**TUTORA**

**LCDA. JOVANNY SANTOS LUNA. Mg.Gs.**

**2015**

**MACHALA - EL ORO – ECUADOR**

## RESUMEN

Los accidentes ofídicos son un problema que conlleva a múltiples complicaciones de salud para que esta situación se presente se requiere de algunos factores como el conocimiento, costumbres, y atención intrahospitalaria, motivo por el cual se planteó la siguiente investigación que tuvo como objetivo; Determinar la prevalencia y complicaciones de los accidentes ofídicos en los pacientes atendidos en el hospital San Vicente De Paúl. Pasaje. 2012-2014. Utilizando un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal se estudió una población de 128 usuarios que en los años de estudio presentaron accidente ofídico, desarrollado el estudio en tres fases la primera donde se realiza el levantamiento de datos mediante un cuestionario que se despeja de la operacionalización de variables revisando directamente las historias clínicas de los pacientes, la segunda etapa de la investigación es en el desarrollo de un plan educativo dirigido a los usuarios y al personal de salud con enfoque educativo y procedimental para el tratamiento de esta situación, la tercera etapa que fue de evaluación utilizando los siguientes indicadores, proceso, producto e impacto, donde mediante un cuestionario se mide la pertinencia del plan educativo, el mismo que destaco los siguientes resultados; en un 45% se dieron los accidentes ofídicos en el año 2012, disminuyendo para el 2013 con un 28% y un 27% para el 2014 manteniéndose estacionario, el ofidio mayor prevalente en el Bothrops con un 62%, la severidad de las complicaciones en un 56% fue leve, la edad con mayor prevalencia es de 49-59 años. En un 83% en hombres que laboran en un 54% en agricultura.